

Zwichnięcie rzepki u psów ras małych

Jak zapobiec bólowi i zwyrodnieniom kolana?

Mini-poradnik edukacyjny Primavet

Część misji „Primavet 2035 – mniej chorób, więcej zdrowia”

Dlaczego ten temat jest tak ważny?

U psów ras małych i miniaturowych **zwichnięcie przyśrodkowe rzepki** jest jedną z **najczęstszych chorób ortopedycznych**.

Problem polega na tym, że:

- ➔ **na początku często nie daje żadnych objawów,**
- ➔ **bywa bagatelizowane przez właścicieli,**
- ➔ **a jego konsekwencje pojawiają się dopiero po latach – w postaci bólu i zwyrodnień.**

Jakie rasy są najbardziej narażone?

Zwichnięcie rzepki najczęściej dotyczy ras:

- **yorkshire terrier**
- **chihuahua**
- **szpic miniaturowy**
- **ratlerek**
- **maltańczyk**
- **oraz innych ras małych i miniaturowych**

U tych psów budowa kończyny predysponuje do nieprawidłowego toru ruchu rzepki już od młodego wieku.

Jak może objawiać się problem?

W początkowym stadium właściciele często obserwują:

- **sporadyczne „podskakiwanie” na jednej tylnej łapie,**
- **chwilowe unoszenie kończyny podczas biegu,**
- **brak wyraźnego bólu.**

To złudne poczucie bezpieczeństwa.

Z czasem zwichnięcie rzepki prowadzi do:

- ✗ przewlekłego stanu zapalnego,
- ✗ zwyrodnień stawu kolanowego,
- ✗ a bardzo często do **zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego**.

Kiedy należy zbadać psa?

👉 **Najlepszy moment na badanie w kierunku zwichnięcia rzepki to wiek od 6 do 10 miesięcy życia.**

Dlaczego właśnie wtedy?

- staw jest jeszcze plastyczny,
- możemy wcześniej ocenić stopień zwichnięcia,
- możliwe jest wdrożenie skutecznego postępowania profilaktycznego lub zabiegowego,
- **możemy zapobiec ciężkim konsekwencjom w dorosłym życiu.**

Po wystąpieniu zmian zwyrodnieniowych leczenie staje się znacznie trudniejsze i mniej skuteczne.

Co daje wczesna diagnostyka?

- ✓ zmniejsza ryzyko bólu w dorosłym wieku,
- ✓ chroni staw kolanowy przed zwyrodnieniami,
- ✓ zmniejsza ryzyko zerwania więzadła krzyżowego,
- ✓ pozwala uniknąć długotrwałego leczenia farmakologicznego,
- ✓ poprawia komfort życia psa na lata.


💬 **Profilaktyka zawsze jest skuteczniejsza niż leczenie powikłań.**

Co możesz zrobić jako właściciel?

- zbadaj psa w odpowiednim wieku (6–10 miesięcy),
- unikaj nadwagi,
- unikaj śliskich podłóg,
- konsultuj niepokojące objawy nawet jeśli są sporadyczne,

- zapytaj lekarza weterynarii o ocenę rzepek podczas wizyty kontrolnej.

Podsumowanie

 Zwichnięcie rzepek to nie „drobna wada”.

 To schorzenie, które **nieleczone prowadzi do bólu i zwyrodnień**.

 Wczesne badanie może zmienić całe przyszłe życie Twojego psa.

Primavet – mniej chorób, więcej zdrowia.

Misja Primavet 2035 – 10 lat pracy dla zdrowych stawów psów i kotów.